



INFORMACE PRO OČKOVANÉ

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Vyplňte a vytiskněte si předem Dotazník před očkováním a vyplňte jej v klidu doma. Ušetříte tak čas na očkovacím místě. Nejste li si jistí s odpovědí, tak se zeptejte lékaře na očkovacím místě.

Jak se chovat na očkovacím místě?

- » Dodržujte pokyny personálu.
- » **Veďte si s sebou své brýle**
- » Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte **zakrytá ústa a nos** (rouška, respirátor).
- » Kdykoli je to možné, **dezinfikujte si ruce**.
- » Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav **odpovídejte pravdivě**.

Jak očkování probíhá?

- » Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
- » Očkování se aplikuje **do svalu v oblasti ramene**.
- » Po očkování musíte **15–30 minut počkat v čekárně** pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
- » Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, **informujte okamžitě personál**.
- » Za určený počet dní je potřeba podstoupit **druhou dávku očkování**, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší

Co mám dělat po očkování?

- » V den očkování i následující den je vhodné dodržovat **klidový režim**.
- » Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna **opatření k zabránění Vaší nákazy** (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).
- » Na druhou dávku očkování se **dostavte v den i přesný čas**, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

- » Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní **samy odezní** bez nutnosti léčby.
- » Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
- » Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná **nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit** a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
- » V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe, svoji rodinu, ale i své okolí.